

- 本產品以在日本國內進行銷售及使用為目的，是經過日本有關確保醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性的相關法律認可的醫藥品。
- 多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。該資料並不保證所記載的內容及該產品本身符合日本以外國家的法律法規。
- 多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前告知即進行修改或更改。
- 由於多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不負擔一切責任。

服用時請務必詳閱本說明書。此外，請妥善保管本說明書以方便於必要時取讀。



**テイガンA** 糖衣

第2類醫藥品

腸胃藥

大幸藥品

### 正露丸糖衣A

腸胃藥 **正露丸糖衣A**是早在100年前就已問世的正露丸的姊妹商品，也是家庭的常備藥。主要成分是日本藥典（簡稱日局）中的生藥木餚油，不會停止腸道的運動，而是調整腸道內的水分均衡，使腸胃恢復正常狀態。特別是對於水土不服、消化不良等起因於食物、飲水的軟便、腹瀉，或是壓力、感冒等引起的軟便、腹瀉，都能發揮極佳的效果。本藥劑使用日本藥典中的木餚油、老鸛草粉末、以及黃柏樹皮萃取物等生藥，調和成無異味且易服用白色錠劑。

### [使用時的注意事項]

#### 禁止事項

（若不遵守禁止事項，目前的症狀可能會惡化、或者容易產生副作用或發生事故）

1. 有下列情況者禁止服用。

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分導致過敏症狀（發疹、發紅、發癢、浮腫等）者
- (2) 接受透析治療者

2. 請勿長期連續服用。

#### 諮詢事項

1. 服用本藥劑之前，有下列情況者請向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 腹瀉伴隨發燒者，有血便者或持續有黏液便者
- (3) 孕婦、可能妊娠者或哺乳期者
- (4) 高齡者
- (5) 曾有藥物或化妝品等引起過敏症狀者
- (6) 肝臟或腎臟疾病患者

2. 服用後發生以下症狀，有可能是產生副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、浮腫
消化器官	噁心及嘔吐、便秘、食慾不振、胃部不適
精神神經系統	頭暈、頭痛

3. 使用數日後（以5~6天為基準），症狀仍未改善時請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

（請繼續閱讀背面內容）

## [ 功 能 ]

軟便、腹瀉、因食物引發的腹瀉、水土不服、上吐下瀉、消化不良引起的腹瀉

## [ 用法與用量 ]

請在飯後（最好在30分鐘內）以冷水或溫水一起服用下列劑量。

年齡	1次用量	每日服用次數
成人（15歲以上）	4錠	3 次
11歲以上 未滿15歲	3錠	
5歲以上 未滿11歲	2錠	
未滿5歲	請勿服用	

### [ 用法與用量的注意事項 ]

- (1) 請務必遵守規定的用法與用量服用。
- (2) 5歲以上的兒童服用時，請在家長的指導監督下服用，以免出現服用錯誤劑量或錠劑卡在喉嚨。

## [ 成分與分量 ]

每12錠（成人1日最大服用量）中含有以下成分。

成分	分量	功能
日本藥典 木餾油*	270mg	使過度蠕動的大腸恢復正常、調整腸道內的水分量
日本藥典 老鶴草粉末	300mg	調整腸道的運動
黃柏樹皮萃取物	300mg	健胃、腸內抑菌

添加物含有矽酸鉛鎂、矽酸鋁、甲基纖維素、羥丙基纖維素、羧甲基纖維素鈣、硬脂酸鎂。此外，糖衣錠層含有白糖、阿拉伯樹膠、明膠、滑石粉、碳酸鈣、氧化鈦、羧甲基纖維素鈉、聚乙烯二醇、巴西棕櫚蠟、白蜂蠟。

※一般所謂的「雜酚油」不僅是日本藥典中的生藥木餾油、還有萃取自煤炭的工業用雜酚油（煤炭雜酚油），但這兩者在原料、成分及用途上是完全不同的物質。

此外，經過致癌性試驗的結果顯示，日本藥典的木餾油並無致癌性。

關於本公司產品的文獻以及詳細內容，

請參考官網（<http://www.seirogan.co.jp>）或連繫客服。

## [ 保管及使用上的注意事項 ]

1. 請保管在兒童觸碰不到之處。
2. 為避免誤用或變質，請勿換裝至其他容器中。
3. 請蓋緊瓶蓋，避免陽光直射，保管在陰涼的地方。
4. 請勿服用過期藥物。

製造銷售商

# 大幸藥品株式會社

郵遞區號564-0032大阪府吹田市內本町3丁目34番14號

01004102